

## Indikatoren für den Einbezug des Palliativmedizinischen Dienstes

Patient\*innendaten:

**Für Patient\*innen, bei n=? der folgenden Kriterien zutreffen, kann die Konsultation des palliativmedizinischen Dienstes erforderlich sein:**

**Chronische kritische Erkrankung**

Auch, wenn es keinen allgemein festgelegten Konsens darüber gibt, was eine chronische kritische Erkrankung ausmacht, ist diese typischerweise durch einen Aufenthalt auf der Intensivstation von mehr als 5 Tage charakterisiert

---

**Einsatz spezifischer medizinischer Verfahren bei Patient\*innen mit lebenslimitierenden Krankheiten**

(z.B. Tracheostoma und/oder Beatmung, PEG, Organersatzverfahren)

---

**Alter  $\geq 80$  Jahre**

Alter der\*des Patient\*in: \_\_\_\_\_

**Patient\*innen, die  $> 30$  Tage auf der Station sind**

Aufenthaltsdauer: \_\_\_\_\_ Tage

**Vorhandensein signifikanter medizinischer Komorbiditäten oder eines schlechten funktionellen Ausgangszustands**

---

**Chronische oder unheilbare lebenslimitierende Krankheiten in der Vorgeschichte**

(z. B. metastasierender Krebs, fortgeschrittene Atemwegs-, Herz- oder Nierenerkrankungen, progrediente neurogene Erkrankung)

- 
- **Spezifische akute Erkrankungen**  
(z. B. hypoxische Hirnschädigung, intrazerebrale Blutung)

- 
- **Schlechte Gesamtprognose nach Einschätzung der behandelnden Ärzt\*innen**

- 
- **Wunsch nach palliativer Versorgung von Patient\*innen, Angehörigen oder Stellvertreter\*innen**

- 
- **In Konfliktsituationen im Behandlungsteam und/oder zwischen Patient\*in, Angehörigen und/oder Stellvertreter\*innen**
- 

## Literatur

- (1) Norton SA, Hogan LA, Holloway RG, Temkin-Greener H, Buckley MJ, Quill TE. Proactive palliative care in the medical intensive care unit: effects on length of stay for selected high-risk patients. *Crit Care Med.* 2007 Jun;35(6):1530-5. doi: 10.1097/01.CCM.0000266533.06543.0C. PMID: 17452930.
- (2) Campbell ML, Guzman JA. Impact of a proactive approach to improve end-of-life care in a medical ICU. *Chest.* 2003 Jan;123(1):266-71. doi: 10.1378/chest.123.1.266. PMID: 12527629.
- (3) Campbell ML, Guzman JA. A proactive approach to improve end-of-life care in a medical intensive care unit for patients with terminal dementia. *Crit Care Med.* 2004 Sep;32(9):1839-43. doi: 10.1097/01.ccm.0000138560.56577.88. PMID: 15343010.
- (4) Mosenthal AC, Weissman DE, Curtis JR, Hays RM, Lustbader DR, Mulkerin C, Puntillo KA, Ray DE, Bassett R, Boss RD, Brasel KJ, Campbell M, Nelson JE. Integrating palliative care in the surgical and trauma intensive care unit: a report from the Improving Palliative Care in the Intensive Care Unit (IPAL-ICU) Project Advisory Board and the Center to Advance Palliative Care. *Crit Care Med.* 2012 Apr;40(4):1199-206. doi: 10.1097/CCM.0b013e31823bc8e7. PMID: 22080644; PMCID: PMC3307874.
- (5) Nelson JE, Curtis JR, Mulkerin C, Campbell M, Lustbader DR, Mosenthal AC, Puntillo K, Ray DE, Bassett R, Boss RD, Brasel KJ, Frontera JA, Hays RM, Weissman DE; Improving Palliative Care in the ICU (IPAL-ICU) Project Advisory Board. Choosing and using screening criteria for palliative care consultation in the ICU: a report from the Improving Palliative Care in the ICU (IPAL-ICU) Advisory Board. *Crit Care Med.* 2013 Oct;41(10):2318-27. doi: 10.1097/CCM.0b013e31828cf12c. PMID: 23939349.
- (6) Cox CE, Curtis JR. Using Technology to Create a More Humanistic Approach to Integrating Palliative Care into the Intensive Care Unit. *Am J Respir Crit Care Med.* 2016 Feb 1;193(3):242-50. doi: 10.1164/rccm.201508-1628CP. PMID: 26599829.

(7) Bradley CT, Brasel KJ. Developing guidelines that identify patients who would benefit from palliative care services in the surgical intensive care unit. Crit Care Med. 2009 Mar;37(3):946-50. doi: 10.1097/CCM.0b013e3181968f68. PMID: 19237901.